

**Pr DICETEL® Renseignements destinés au patient.**  
**(Bromure de pinavérium)**  
**Comprimés pelliculés**  
**Antagoniste calcique gastro-intestinal**

**Laboratoires Abbott, Limitée**  
**8401, route Transcanadienne**  
**Saint-Laurent (Québec)**  
**H4S 1Z1**

Les renseignements qui suivent constituent un résumé des données sur DICETEL et une explication de son mode d'emploi. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

**Qu'est-ce que DICETEL?**

DICETEL est la marque de commerce du médicament, le bromure de pinavérium. Il se présente sous la forme d'un comprimé pelliculé, rond et orange renfermant soit 50 mg ou 100 mg de bromure de pinavérium. De plus, les comprimés renferment aussi les ingrédients non médicinaux suivants : cellulose microcristalline, amidon de maïs modifié, lactose modifié, silice anhydre hydrophobe, talc, stéarate de magnésium, copolymère de méthacrylate butylé basique, laurylsulfate de sodium, acide stéarique, talc, Sepisperse Dry 3203 (hydroxypropylméthylcellulose, cellulose microcristalline, anatase de dioxyde de titane, jaune soleil [laque d'aluminium]).

Si vous êtes allergique à l'une ou à l'autre de ces substances, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien pour déterminer si ces ingrédients peuvent poser un problème dans votre cas.

**Comment DICETEL agit-il?**

DICETEL agit en déclanchant une relaxation au niveau des muscles de la paroi intestinale (c'est-à-dire au niveau des intestins). DICETEL traite et soulage les symptômes associés au syndrome du côlon irritable (SCI) tels que les douleurs abdominales, les troubles du fonctionnement intestinal (constipation et/ou diarrhée) et la sensation d'inconfort intestinal (ballonnement).

**Données importantes que vous devriez mentionner à votre médecin avant de prendre DICETEL :**

- Vous êtes enceinte ou allaitez. Vous ne devez pas utiliser DICETEL si vous allaitez.
- Vous êtes allergiques ou avez eu des réactions à l'un ou l'autre des ingrédients de DICETEL (voir sous la rubrique Qu'est-ce que DICETEL?).
- Vous avez une intolérance au lactose; dites-le à votre médecin puisque ce produit contient du lactose.
- Vous présentez un rare problème d'intolérance à certains sucres ou vous avez de la difficulté à assimiler certains sucres (intolérance au galactose, déficit en lactase de Lapp ou malabsorption du glucose-galactose); ne prenez pas ce médicament avant d'en parler à votre

médecin, car il contient du lactose.

- Vous avez des lésions à l'œsophage, y compris une hernie touchant l'œsophage.
- Vous avez d'autres problèmes médicaux et (ou) vous prenez d'autres médicaments.

### **Comment prendre les comprimés DICETEL :**

- Prenez-les en suivant à la lettre les instructions de votre médecin. Chez l'adulte, la posologie de DICETEL est de 50 à 100 mg trois fois par jour.
- Pour éviter que votre œsophage ne soit irrité, il faut avaler le comprimé entier avec un verre d'eau au moment des repas. Il ne faut ni écraser, ni mâcher, ni sucer le comprimé.
- Il ne faut pas prendre les comprimés si vous êtes allongé ou peu de temps avant d'aller vous coucher.

### **Que devez-vous faire si vous avez oublié une dose?**

Si vous avez oublié de prendre un comprimé DICETEL, prenez-le dès que vous vous en apercevez. Toutefois, si la prise de votre prochaine dose n'est pas éloignée, sautez la dose oubliée et reprenez votre calendrier habituel. Ne doublez pas la dose.

### **Que devez-vous faire dans le cas d'une dose excessive?**

En cas de surdosage, communiquez avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région immédiatement, même si vous ne présentez aucun symptôme.

Ne changez jamais la quantité de DICETEL que vous prenez, sauf selon l'avis de votre médecin. Si vous avez pris plus de comprimés DICETEL que la dose recommandée, communiquez immédiatement avec un médecin. Montrez-lui votre emballage de comprimés.

### **Quels sont les effets secondaires possibles du traitement avec DICETEL?**

La plupart des gens tolèrent bien DICETEL. Comme tous les médicaments, DICETEL peut toutefois occasionner des effets secondaires chez certaines personnes. Ces effets, lorsqu'ils se produisent, tendent à être de nature bénigne. Certaines personnes peuvent éprouver des maux d'estomac et/ou une sensation de plénitude, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, de la difficulté à avaler, de la constipation, des brûlures d'estomac, un ballonnement ou de la diarrhée. Puisque ces effets secondaires sont semblables aux symptômes du SCI, il peut être difficile d'en faire la distinction. Parmi les autres effets secondaires possibles, mentionnons maux de tête, sécheresse de la bouche, somnolence, étourdissements, allergie cutanée, éruption cutanée, démangeaisons, urticaire, rougeur de la peau et réactions allergiques. Des lésions à l'œsophage peuvent survenir si vous ne prenez pas les comprimés DICETEL selon la méthode d'administration indiquée. Si vous présentez ces effets ou tout autre problème lorsque vous prenez DICETEL, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Comment conserver vos comprimés.**

- Conservez DICETEL dans son emballage alvéolé d'origine à l'intérieur de la boîte que vous a remise votre pharmacien afin de le protéger de la lumière.
- Conservez-le à température ambiante entre 15 °C et 30 °C.

- Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Ne prenez pas vos comprimés après leur date limite d'utilisation.

**N'oubliez pas que ce médicament vous a été prescrit selon votre cas. Ne le partagez pas avec quelqu'un d'autre, même s'il éprouve des symptômes semblables aux vôtres. Seul un médecin est habilité à prescrire DICETEL.**

®Marque déposée de Abbott Products Operations AG, utilisée sous licence par Abbott Laboratories, Limited, Saint-Laurent, Quebec, H4S 1Z1

Dernière révision: Le 30 juin 2011