

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PATIENT

Les médecins et les pharmaciens peuvent obtenir les renseignements d'ordonnance complets sur demande.

LIPIDIL MICRO abaisse le taux de cholestérol sanguin, particulièrement celui du cholestérol lié aux lipoprotéines de faible ou de très faible densité (cholestérol des LDL et des VLDL). LIPIDIL MICRO réduit aussi les taux élevés de triglycérides associés à une hypercholestérolémie. LIPIDIL MICRO réduit aussi le taux d'acide urique. Le mécanisme d'action de LIPIDIL MICRO n'est pas complètement élucidé.

LIPIDIL MICRO ne peut être obtenu que sur ordonnance d'un médecin. Le médicament doit être utilisé uniquement comme traitement d'appoint à un régime alimentaire recommandé et surveillé par le médecin, pour le traitement de longue durée des taux élevés de lipides dans le sang. La prescription du médicament ne dispense aucunement de l'observance du régime alimentaire. De plus, selon le cas, le médecin peut recommander la pratique d'une activité physique, une réduction de poids ou d'autres mesures.

Prenez le médicament tel que prescrit par votre médecin. Ne changez pas la dose de médicament à moins d'un avis contraire de sa part. Consultez votre médecin avant d'interrompre le traitement, car cela peut entraîner une élévation des taux de lipides sanguins.

NE PRENEZ PAS LIPIDIL MICRO SI :

- vous êtes atteint d'une maladie du foie ou des reins;
- vous êtes atteint d'un trouble de la vésicule biliaire;
- vous êtes allergique au fénofibrate ou à un médicament semblable, ou encore à l'un ou l'autre des ingrédients contenus dans un comprimé de LIPIDIL MICRO (voir ***Que contient LIPIDIL MICRO?***);
- vous êtes enceinte ou vous allaitez; si vous devenez enceinte durant le traitement, informez-en votre médecin – vous devriez cesser de prendre LIPIDIL MICRO;
- vous manifestez une réaction photoallergique (sensibilité cutanée au soleil ou aux rayons ultraviolets) à un fibrate (classe de médicaments utilisés pour abaisser le taux de cholestérol, à laquelle appartient LIPIDIL MICRO et le gemfibrozil) ou au kétoprofène, un anti-inflammatoire.

AVANT D'ENTREPRENDRE UN TRAITEMENT PAR CE MÉDICAMENT,
votre médecin doit savoir :

- si vous avez eu une réaction allergique à LIPIDIL MICRO (ou si vous tolérez mal ce médicament), à un de ses ingrédients (voir ***Que contient LIPIDIL MICRO?***) ou à un autre traitement contre la dyslipidémie;
- si vous êtes atteint d'une maladie du foie ou des reins;
- si vous êtes atteint d'une maladie de la vésicule biliaire ou si vous présentez des lithiases (calculs) biliaires;

- si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse, si vous allaitez ou si vous envisagez d'allaiter;
- si vous prenez d'autres médicaments, sous ordonnance ou non, en particulier :
 - une statine (classe de médicaments comprenant notamment l'atorvastatine, la pravastatine et la simvastatine, employés pour abaisser le taux de cholestérol);
 - de l'ézétimibe (un autre hypocholestérolémiant);
 - un anticoagulant par voie orale (médicament visant à éclaircir le sang, comme la warfarine);
 - de la cyclosporine (médicament souvent prescrit après une greffe d'organe);
 - de la cholestyramine ou un médicament du même type (un autre hypocholestérolémiant);
 - des œstrogènes (hormones susceptibles d'être présentes dans les contraceptifs oraux ou une hormonothérapie de substitution);
 - le rosiglitazone (un médicament utilisé pour traiter le diabète de type 2).

MODE D'EMPLOI APPROPRIÉ DU MÉDICAMENT

- Prenez LIPIDIL MICRO avec les repas, tel que vous l'a prescrit votre médecin.
- Il est très important de suivre cette directive car LIPIDIL MICRO est moins bien absorbé et donc moins efficace lorsqu'il est pris sans aliment.
- Chez un adulte, la posologie de LIPIDIL MICRO habituellement recommandée est de une capsule de 200 mg.
- Ne changez pas la dose de votre médicament sans la recommandation de votre médecin.
- L'emploi de LIPIDIL MICRO chez les enfants n'est pas recommandé.
- L'innocuité liée à l'administration de LIPIDIL MICRO en association avec une statine n'a pas fait l'objet d'études approfondies chez des patients. Par conséquent, la prise du fénofibrate en association avec une statine doit être évitée à moins d'avis contraire de la part de votre médecin.
- Informez votre médecin de tout malaise ressenti au cours du traitement par LIPIDIL MICRO. Si vous devez recevoir un autre traitement médical, informez votre médecin que vous prenez LIPIDIL MICRO.

EFFETS SECONDAIRES

En plus de l'effet escompté, tout médicament peut produire des effets indésirables.

Informez votre médecin de tout malaise ressenti au cours du traitement par LIPIDIL MICRO.

Parmi les effets secondaires les plus fréquents figurent des douleurs abdominales, de la constipation, de la diarrhée, des nausées, des maux de tête, des étourdissements, des réactions cutanées et de la fatigue. Veuillez noter toutefois que cette liste n'est pas exhaustive. Si vous éprouvez d'autres symptômes inattendus lors de la prise de LIPIDIL MICRO, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

Des douleurs, des crampes ou une faiblesse musculaires constituent des effets secondaires rares, mais plus graves. Si vous ressentez des douleurs musculaires inexplicables, cessez de prendre votre médicament et communiquez avec votre médecin immédiatement.

Votre médecin vous demandera de vous soumettre régulièrement à un examen médical et à des analyses de laboratoire, le cas échéant. Nous vous recommandons fortement de respecter vos rendez-vous à ces examens. En vous y rendant au moment convenu, vous contribuerez en effet au dépistage rapide d'une éventuelle anomalie.

QUE CONTIENT LIPIDIL MICRO?

LIPIDIL MICRO renferme, en plus du fénofibrate, les ingrédients non médicinaux suivants : lactose, amidon prégélatiné, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium et polyvinylpyrrolidone réticulé.

CE MÉDICAMENT VOUS EST PRESCRIT POUR LE TRAITEMENT D'UN PROBLÈME DE SANTÉ PARTICULIER ET POUR VOTRE USAGE PERSONNEL. NE LE DONNEZ PAS À D'AUTRES PERSONNES.

GARDEZ TOUS LES MÉDICAMENTS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

POUR PLUS D'INFORMATION, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

® Lipidil MICRO : Marque déposée de Fournier Industrie et Santé S.A. Dijon France utilisée sous licence par Fournier Pharma Inc. Saint-Laurent (Québec) H4S 1Z1

Dernière révision : 15 juillet 2011