

## RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU CONSOMMATEUR

**TEVETEN<sup>®</sup> PLUS (600 mg d'éprosartan sous forme de mésylate d'éprosartan et 12,5 mg d'hydrochlorothiazide) en comprimés**

### Mises en garde et précautions importantes

**TEVETEN<sup>®</sup> PLUS ne devrait pas se prendre durant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte durant votre traitement avec TEVETEN<sup>®</sup> PLUS, veuillez immédiatement discuter avec votre médecin de l'arrêt de ce médicament.**

Veillez lire ce feuillet d'information avant de commencer à prendre votre médicament.

Conservez ce feuillet d'information jusqu'à ce que vous ayez fini de prendre tous vos comprimés.

Vous souhaiterez peut-être le relire.

Si vous aidez une autre personne à prendre TEVETEN<sup>®</sup> PLUS, lisez ce feuillet d'information avant de lui donner le premier comprimé.

N'oubliez pas que ce médicament est destiné à la personne désignée par le médecin. **Ne le donnez jamais** à quelqu'un d'autre.

Vous devez suivre les conseils du médecin et prendre les comprimés conformément aux instructions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, veuillez vous informer auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Gardez toujours les médicaments hors de la portée des enfants.** Retournez tout médicament superflu ou inutilisé au pharmacien.

### **Qu'est-ce que TEVETEN<sup>®</sup> PLUS?**

TEVETEN<sup>®</sup> PLUS est utilisé pour traiter la haute pression sanguine. Il contient deux ingrédients actifs, du mésylate d'éprosartan et de l'hydrochlorothiazide. TEVETEN<sup>®</sup> PLUS renferme également les ingrédients non médicinaux suivants : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, amidon prégélatiné, crospovidone, stéarate de magnésium, alcool polyvinylique,

macrogol 3350, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer noir et oxyde de fer jaune. Si vous suivez un régime particulier ou si vous êtes allergique à une substance quelconque (y compris les médicaments thiazidiques ou à base de sulfamide), demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si l'un de ces ingrédients peut poser un problème dans votre cas. Il est également important de mentionner à votre médecin et à votre pharmacien les autres médicaments que vous prenez, ainsi que les produits à base d'herbes médicinales et les médicaments en vente libre.

TEVETEN<sup>®</sup> PLUS est une association d'un antagoniste de l'angiotensine II (le mésylate d'éprosartan) et d'un diurétique (l'hydrochlorothiazide).

L'angiotensine II est une hormone naturelle produite par le corps qui agit en resserrant les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la pression sanguine lorsqu'elle devient trop basse. L'éprosartan, contenu dans TEVETEN<sup>®</sup> PLUS, agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II et donne lieu ainsi à une baisse de la pression sanguine. L'hydrochlorothiazide, un diurétique thiazidique, agit en permettant aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ensemble, l'éprosartan et l'hydrochlorothiazide abaissent la haute pression sanguine.

### **Qu'est-ce que l'hypertension?**

L'hypertension est le terme médical qui désigne la haute pression sanguine. Cette dernière accroît le travail du cœur et des artères. Si cet état dure longtemps, des lésions des vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins peuvent survenir et provoquer éventuellement un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. La haute pression sanguine accroît aussi le risque de crise cardiaque. La réduction de votre pression sanguine atténue votre risque de développer ces maladies.

### **Quelles sont les causes de l'hypertension?**

Dans la plupart des cas, on ignore quelle est la cause première de l'hypertension, bien que plusieurs facteurs accroissent le risque d'apparition de la maladie. Les facteurs de risque les plus fréquents comprennent les antécédents familiaux, l'âge, la race, le poids, la consommation d'alcool et l'usage du tabac. L'hypertension est une maladie de longue durée qui, à ses premiers stades, ne provoque souvent aucun symptôme.

**Avant de prendre TEVETEN<sup>®</sup> PLUS, vous devez informer votre médecin des éventualités suivantes :**

- ✓ Si vous prenez d'autres médicaments, y compris les produits à base de plantes médicinales et les médicaments en vente libre. Cela comprend les autres médicaments pour le traitement de la haute pression sanguine, les médicaments antiarthritiques, les médicaments antidiabétiques, etc.
- ✓ Si vous êtes enceinte, soupçonnez de l'être ou envisagez de le devenir. La prise de TEVETEN<sup>®</sup> PLUS durant la grossesse peut causer un tort au fœtus, voire son décès. Ce médicament ne doit pas être pris pendant la grossesse. Si vous devenez enceinte ou projetez de le devenir durant votre traitement avec TEVETEN<sup>®</sup> PLUS, veuillez immédiatement discuter avec votre médecin de l'arrêt de ce médicament.
- ✓ Si vous allaitez. On sait que les ingrédients médicinaux de TEVETEN<sup>®</sup> PLUS (éprosartan et hydrochlorothiazide) passent dans le lait maternel. Vous ne devriez donc pas prendre ces comprimés si vous allaitez.
- ✓ Si vous éprouvez de quelconques problèmes au cœur, au foie ou aux reins, mentionnez-les à votre médecin avant de commencer à prendre les comprimés.
- ✓ Si vous prenez des suppléments potassiques ou des succédanés du sel à base de potassium, consultez votre médecin.
- ✓ Si vous êtes diabétique, il se peut que vous deviez surveiller plus étroitement votre glycémie (taux de sucre dans le sang) au début de votre traitement par TEVETEN<sup>®</sup> PLUS.
- ✓ Si vous prenez du lithium, vous devez surveiller plus étroitement votre taux de lithium.
- ✓ Si vous avez déjà présenté de quelconques symptômes inhabituels ou défavorables ou si vous avez déjà eu une réaction allergique à TEVETEN<sup>®</sup> PLUS, à l'éprosartan ou à l'hydrochlorothiazide.

**Vous ne devriez PAS prendre TEVETEN<sup>®</sup> PLUS si :**

- ✓ Vous êtes allergique à l'un des composants de TEVETEN<sup>®</sup> PLUS (voir **Qu'est-ce que TEVETEN<sup>®</sup> PLUS?**). Il est possible que vous ayez des symptômes allergiques si vous avez fait dans le passé une réaction aux thiazidiques ou aux sulfamides.
- ✓ Vous êtes enceinte. Lorsqu'ils sont utilisés durant la grossesse, des médicaments comme TEVETEN<sup>®</sup> PLUS peuvent causer des lésions au fœtus, voire sa mort. Par conséquent, il est

- ✓ Vous allaitez.
- ✓ Vous souffrez de problèmes aux reins.

## **Comment prendre TEVETEN<sup>®</sup> PLUS?**

### **Posologie habituelle**

Suivez les instructions du médecin sur la façon et le moment de prendre votre médicament. La dose habituelle est de un comprimé de 600 mg/12,5 mg une fois par jour

Veillez lire l'étiquette attentivement. Si vous souhaitez poser des questions au sujet de votre médicament et sur la façon de le prendre, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

TEVETEN<sup>®</sup> PLUS peut se prendre avec ou sans aliment, mais on devrait le prendre toujours de la même façon en ce qui concerne la nourriture, et au même moment, chaque jour.

Continuez de prendre votre médicament tant que le médecin vous le dira. En général, le traitement de la haute pression sanguine est un traitement à vie. Bien avant que votre provision d'un médicament prescrit ne soit épuisée, il est important de faire les démarches nécessaires auprès de votre médecin pour en faire renouveler l'ordonnance. Évitez de manquer de vos médicaments. Continuez de suivre les instructions du médecin.

### **Que faire si vous oubliez de prendre une dose?**

Si vous oubliez de prendre un comprimé, prenez-le dès que vous vous en apercevez. Prenez votre prochaine dose au moment prévu. Ne prenez pas deux doses à intervalle de moins de 6 heures entre les deux.

### **Que dois-je faire si j'ai pris trop de comprimés?**

Si vous avez pris plus de comprimés que la dose recommandée, dites-le immédiatement à un médecin et montrez-lui l'emballage de comprimés.

### **Renseignements sur les effets secondaires possibles :**

Comme tous les médicaments, TEVETEN<sup>®</sup> PLUS peut causer des réactions non voulues, dites effets secondaires. Bien que la plupart des patients n'ont aucun effet secondaire lorsqu'ils prennent TEVETEN<sup>®</sup> PLUS, certains patients peuvent éprouver les suivants : maux de tête, étourdissements, sensations de tête légère, éruptions cutanées, toux, douleurs articulaires ou musculaires, fatigue, faiblesse, lassitude, hypotension artérielle ou évanouissement. Si vous manifestez un inconfort inhabituel, dites-le au médecin dans les plus brefs délais.

Des effets secondaires tels qu'une myalgie (douleur musculaire), une myasthénie (faiblesse musculaire), une myosite (inflammation du tissu musculaire) et une rhabdomyolyse (atrophie musculaire), menant dans de rares cas à une insuffisance rénale, ont été signalés suite à l'utilisation des antagonistes du récepteur de l'angiotensine, la classe de médicaments à laquelle TEVETEN<sup>®</sup> PLUS appartient. Vous devriez communiquer avec votre médecin dans les plus brefs délais si vous éprouvez une douleur musculaire inexplicée, une sensibilité ou une faiblesse musculaire, ou si vous notez que vos urines sont foncées ou brunes.

De très rares cas de réactions allergiques ont été signalés en rapport avec l'éprosartan. Si vous développez de la difficulté à respirer ou à avaler, ou encore, si vous éprouvez de l'enflure au niveau du visage, des lèvres et(ou) de la langue, cessez de prendre TEVETEN<sup>®</sup> PLUS et communiquez immédiatement avec votre médecin.

### **Comment conserver TEVETEN<sup>®</sup> PLUS?**

La date de péremption du médicament est imprimée sur l'étiquette. Conservez vos comprimés dans leur emballage d'origine, à une température de 15 à 25 °C et à l'abri de l'humidité.

<sup>®</sup> Marque déposée de Abbott Products Operations AG. Usager autorisé : Laboratoires Abbott, Limitée, Saint-Laurent, Quebec, H4S 1Z1

Dernière révision : 30 août 2011